



# Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant with Bleach

One-step cleaning, disinfecting and deodorizing of hard, nonporous surfaces\*

For more information, contact your Clorox representative or call (800) 234-7700.  
email: healthcare@clorox.com  
visit us: www.cloroxprofessional.com



1. REMOVE gross soil if visible. For *C. difficile* spores, always clean surface prior to disinfecting.†



2. SPRAY 6"-8" from surface until surface is completely wet, or APPLY with a clean cloth, mop or sponge saturated with DISPATCH® product until surface is completely wet.



3. To DISINFECT, let stand for 1 MINUTE. To kill TB, allow 30 seconds contact at room temperature. To kill *C. difficile* spores, allow 5 minutes contact. WIPE with a clean, damp cloth. Allow to air dry.



**Commercial  
SOLUTIONS®**

© 2011 Clorox Professional  
Products Company  
1221 Broadway, Oakland,  
CA 94612

This product may be used on stainless steel, glazed ceramic tile, hard plastics, nonporous vinyl, painted surfaces, Plexiglas, laminated plastic countertops, fiberglass (sealed) surfaces, glazed porcelain and glass.

**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not use this product with ammonia or acids such as vinegar, rust removers or toilet bowl cleaners. Not intended for use on fabrics. Use by expiration date.

\*Look on the product label for additional directions for other applications such as for food-contact surfaces, veterinary sites and instrument precleaning or disinfection. For *C. difficile* spores, EPA requires surface cleaning prior to disinfecting.

† This is a one-step product. Precleaning is required only if blood, vomit, fecal matter or other soil is visible, or in advance of disinfecting *C. difficile* spores. *C. difficile* spore claim has been registered by the Federal EPA and may not be available in all 50 states. Check with your sales representative for updates in your State.

## Limpiador Dispatch® para Uso en Hospitales Desinfectante con Blanqueador Limpia, desinfecta y desodoriza superficies duras y sin poros en un sólo paso\*

Para más información, comuníquese con su representante de Clorox o llame al (800) 234-7700. correo electrónico: healthcare@clorox.com visítenos: www.cloroxprofessional.com



**1.** QUITE la mugre visible y grande. Para las esporas *C. difficile*, limpie siempre la superficie antes de desinfectar.†



**2.** ROCÍE 6-8 pulgadas de la superficie hasta que esté completamente mojada, o APLIQUE con un paño, esponja o trapeador limpio saturado con el producto DISPATCH® hasta que la superficie esté completamente mojada.



**3.** Para DESINFECTAR, deje reposar por 1 MINUTO. Para eliminar la TB, deje 30 segundos de contacto a temperatura ambiental. Para eliminar las esporas de *C. difficile*, deje 5 minutos de contacto. LIMPIE con un paño limpio y húmedo. Deje secar al aire.



**Commercial  
SOLUTIONS®**

© 2011 Clorox Professional Products Company  
1221 Broadway, Oakland, CA 94612

Este producto se puede usar en acero inoxidable, azulejo de cerámica barnizado, plásticos duros, vinilo sin poros, superficies pintadas, Plexiglas, mostradores laminados en plástico, superficies de fibra de vidrio (selladas), porcelana barnizada y vidrio.

**PRECAUCIÓN:** Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese completamente con agua y jabón después de usar. No utilice este producto con amoníaco ni ácidos como vinagre, removedores de óxido o productos para limpiar el inodoro. No está hecho para usar en telas. Utilice antes de la fecha de vencimiento.

\*Mire en la etiqueta del producto para instrucciones adicionales para otras aplicaciones como en superficies que entran en contacto con los alimentos, sitios veterinarios y la limpieza previa o desinfección de instrumentos. Para las esporas *C. difficile*, la EPA requiere la limpieza de la superficie antes de desinfectar.

† Este es un producto de un sólo paso. Se requiere una limpieza previa sólo si se trata de sangre, vómito, materia fecal u otra mugre visible, o antes de desinfectar las esporas de *C. difficile*.